

СТАН НОСІЙСТВА Hb_Ag СЕРЕД РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М.М.Шарлай, А.П.Резніков, І.С.Муляр, Ж.К.Сапего

Ровенська обласна епідеміологічна станція

Носії Hb_Ag вважаються головним і найпотужнішим джерелом інфекції вірусного гепатиту В /ВГВ/. Тому постійне спостереження за носійством Hb_Ag є важливою складовою частиною епідеміологічного нагляду за цією інфекцією /С.Л.Мукомолов, С.А.Козлов та ін.//.

Метою роботи було вивчення епідеміологічних закономірностей носійства Hb_Ag серед різних груп населення Ровенської області, які проживали поза відомими вогнищами ВГВ за період 1986-1990 років методом РІГА.

Серед 2547 дорослих соматичних хворих виявлено 58 /2,2%/ носіїв Hb_Ag , серед 439 дітей - 6 /1,3%/, серед 1761 медпрацівників - 14 /0,79%/, 8838 вагітних - 65 /0,73%/.

В 1990 році методом ІФА серед 138 вагітних виявлено 7 /5%/ носіїв Hb_Ag .

Разом з Інститутом вірусології ім. Д.І.Івановського АМН СРСР /лабораторія проф. І.В.Шахгільдяна/ нами проведено дослідження на анти- Hb_Ag методом ІФА 60 вагітних, виявлено 5 позитивних /8,3%/, методом РІА 72 вагітних - 5 позитивних /6,9%/ і 43 дітей - 1 позитивний /2,2%/.

Виявлені групи підвищеного ризику інфікування: туберкульозні хворі /серед 2049 чол. - 134 /6,5%/ носіїв Hb_Ag /, діти закритих колективів /серед 96 дітей будинку грудної дитини - 16 /16,6%/ носіїв/, медпрацівники певних спеціальностей, діти, народжені від Hb_Ag - позитивних матерів.

Ровенська область віднесена до регіону з помірним розповсюдженням ВГВ.

Необхідно продовжити роботу по вивченню динамічних закономірностей носійства Hb_Ag і виявленню факторів ризику для обґрунтованого проведення профілактичних заходів.