

ИТОГИ ИММУНИЗАЦИИ ВАКЦИНОЙ ENGERIX В ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НВ-ВИРУСОМ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

И.В.Шахгильдян, П.А.Хухлов, С.П.Кузин, В.А.Ананьев, Э.И.Счастный, Е.А.Савин, Ж.А.Дробенюк,
М.А.Ходжаева, А.Я.Бурисев, И.С.Муляр, Н.А.Малышев, Л.Д.Жукова, С.М.Клименко
НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, Москва

Вакциной ENGERIX В было иммунизировано против гепатита В (ГВ) 542 ребенка, родившихся у "носителей" HBsAg в Узбекистане и Молдавии (территориях, гиперэндемичных по ГВ), 50000 новорожденных детей в отдельных регионах Киргизии, Туркмении и Тувы с уровнем носительства HBsAg 9,8-11,9%, а также 1553 медработников, 184 учащихся медучилищ, 87 пациентов отделений гемодиализа в Москве и Санкт-Петербурге, 66 воспитанников детских интернатов на Украине (г. Ровно). Вакцинации подлежали лица, у которых при предварительном исследовании крови методом ИФА было исключено наличие маркеров НВ-вирусной инфекции. Установлено, что через месяц после завершения курса вакцинации у 92,3-95,7% привитых в указанных "группах риска" (за исключением пациентов отделений гемодиализа) имело место появление анти-НВ в протективных титрах (10 МЕ/л и выше). Через год эти антитела выявляли у 79,1-90,0% вакцинированных лиц во всех группах и только у половины (53,3%) пациентов отделений гемодиализа. Уровни анти-НВ выше 500 МЕ/л через месяц после окончания курса вакцинации в разных "группах риска" были отмечены у 54,0-78,6% иммунизированных лиц, а через год такая концентрация этих антител сохранялась у 41,0-61,2%. Индекс эффективности вакцинации против гепатита В (при сопоставлении показателей заболеваемости манифестными формами ГВ среди привитых в "группах риска" и лиц, составляющих группы сравнения) колебался от 7,8 до 19,3 и лишь среди больных отделений гемодиализа был равен 2,3. Вакцина была слабореактогенной. Поствакцинальных осложнений отмечено не было.